



SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

BROMBLEU BLOCK

BIOCIDA – Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2013/00125/AUT

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN BLOCCO PARAFFINATO PER USO PROFESSIONALE E NON PROFESSIONALE

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone	0,005 g
Denatonium Benzoate	0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti	q.b. a 100 g

Caratteristiche

BROMBLEU BLOCK è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione.

BROMBLEU BLOCK contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

Per uso non professionale può essere usato all'interno di abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

Per uso professionale può essere usato all'interno ed intorno edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini o aree esterne.

Istruzioni, modalità d'uso e dosi d'impiego

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati.

Per uso NON professionale le esche devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori appropriati a prova di manomissione e debitamente marcati disponibili in commercio. I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori.

Per uso professionale l'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi e nei posti di maggior presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 m di distanza l'uno dall'altro.

Le dosi consigliate sono:

Topolino domestico:	2 esche (40 g) x 100 mq
Ratto grigio:	3-5 esche (60-100 g) x 100 mq
Ratto nero:	3-5 esche (60-100 g) x 100 mq

Controllare regolarmente i contenitori con le esche e sostituire le esche consumate. Effettuare operazioni di controllo ad intervalli frequenti per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo le norme previste. Non gettare le carcasse nei rifiuti o nelle discariche. Utilizzare guanti durante la manipolazione degli animali morti. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento togliere i contenitori ed eliminare le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

Confezioni

Esche rodenticide in blocchi paraffinati da 20 g cadauno

<u>Per Uso Professionale</u>	Scatola da 10 kg	COD 2-188-8-1X10
<u>Per Uso NON Professionale</u>	Busta da 500 g in cartoni da 40 buste	COD 2-1-119-6X40