



SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

CIPEX 10E[®]

Registrazione del Ministero della Salute n. 14780

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER USO DOMESTICO E CIVILE PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Cipermetrina 92% (cis/trans 40/60)	10,25 g (94,3 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100 g

Caratteristiche

Insetticida concentrato emulsionabile contenente Cipermetrina, principio attivo piretroide sintetico dotato di una veloce azione abbattente e di una prolungata capacità di persistenza; formulato con solventi biodegradabili che in fase di decomposizione non sviluppano prodotti pericolosi.

Campo d'impiego

CIPEX 10E[®] è indicato per la lotta contro insetti volanti quali zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe, tafani, chironomidi, pulci, zecche, dermestidi, punteruoli, simulidi, tignole, lasioderma e striscianti quali blatte, formiche, pesciolini d'argento, punteruoli, tribolii, termiti. Può essere impiegato nella disinfestazione di fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico, magazzini ed attrezzature, carrozze ferroviarie e mezzi di trasporto. Negli ambienti chiusi è indicato soprattutto per applicazioni murali in tutti i locali dove le mosche e insetti striscianti trovano facile rifugio. È inoltre efficace per combattere le zanzare ad abitudini prevalentemente emofile. Mediante trattamenti mirati su crepe, fessure ed interstizi di pavimenti e pareti, sulle intelaiature di porte e finestre, è utile per snidare e distruggere gli scarafaggi e per prevenire l'infestazione da formiche. Può essere efficacemente impiegato per il controllo delle zanzare nel trattamento delle aree verdi quali siepi, giardini, viali alberati, cespugli ornamentali e tappeti erbosi.

Dosi e modalità di impiego

CIPEX 10E[®] si usa miscelato in acqua al momento dell'impiego e distribuito con pompe a pressione manuali o atomizzatori a motore in ragione di 1 litro per 15 mq di superficie rispettando le seguenti dosi:

Insetti volanti. Uso in ambienti interni: diluire in ragione dello 0,5-1% (50-100 cc in 10 litri d'acqua) a seconda dell'entità dell'infestazione da distribuire sulle superfici (pareti, piani, persiane, ecc.). La dose maggiore è preferenzialmente indicata per il controllo delle mosche.

Uso esterno: utilizzare la dose dello 0,5-1% (50-100 cc in 10 litri d'acqua) sulle pareti esterne degli edifici, nei piazzali, sotto le siepi ed i cespugli, ecc. Nel trattare le aree verdi si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.

Insetti striscianti. Uso in ambienti interni: diluire in ragione dello 0,5-1% (50-100 cc in 10 litri d'acqua) a seconda dell'entità dell'infestazione e dell'insetto da combattere da distribuire sulle superfici, nelle crepe, sui battiscopa, ecc. La dose più alta è indicata per il trattamento delle blatte. Uso esterno: utilizzare la dose dello 0,5-1% (50-100 cc in 10 litri d'acqua) sulle pareti esterne degli edifici, sui marciapiedi, nei piazzali, ecc.

CIPEX 10E[®] può anche essere miscelato al 2% con solventi a base petroléosa o glicolica (200 ml in 10 litri di solvente) per impieghi con apparecchi a nebbie fredde o calde per nebulizzazioni in ambienti confinati.

Confezioni

- | | |
|---|--------------------|
| - Flacone da 500 ml il scatole da 20 pezzi | COD 1-30-13-20X500 |
| - Flacone da 1 litro in scatole da 12 pezzi | COD 1-30-13-1X12 |
| - Tanica da 10 litri | COD 1-30-13-1X10 |

bleuline^{s.r.l.}